

## 青蛙比特

### 光叶湖草

开阔、浅湿地、沟渠和河岸的机会主义殖民者

科：Pontederiaceae

原产地：北美洲、中美洲和南美洲

习性：常年沉水或浮于浅水区（深度小于15厘米），在热带、亚热带地区无其他植物遮荫时可长至50厘米高并迅速形成致密的垫子

叶：叶片沿茎互生，长5厘米×3厘米，先端钝或圆形，基部二裂，无毛。叶无梗，形成基部莲座丛。有叶柄的叶子可以漂浮或浸没。

花：白色至淡蓝色的花朵，每个总状花序 2-10 朵，日出后约 3 小时开放，下午早些时候枯萎

果实：蒴果，有8-14粒小翅种子；持久

根：根茎在每个节上产生根

传播：茎的破碎碎片，一个或多个完整的节可侵染下游地区；洪水可以将茎碎片散布到相当远的距离。有翅的种子可能通过风和水传播。

控制：昆士兰州生物安全部门报告称，即使用量非常低，也能有效控制意大利淹水水稻中常见的异花草属物种（磺酰脲）（Sparacino 等，1996）



快速适应有利的情况，例如最近被淹没的地区和竞争被破坏的地区（包括对其他物种使用除草剂）。因此，在池塘和污水坑、潮湿的农作物区、沟渠、电力线走廊中。持久的土壤种子库会引起看似自发的侵染。